




ITALO®

PROTECCIÓN ASEGURADA

Tratamiento
con ITALO®
sobre la
superficie
de la hoja



Traslocación
de ITALO®



- Fungicida de acción preventiva, curativa y erradicante.
- Acción translaminar, resistente al lavado.
- Gran uniformidad y adherencia sobre la vegetación tratada.
- Elevada eficacia contra repilo, aceituna jabonosa, moteado, abolladura, cribado y antracnosis.
- No provoca defoliación.
- Compatible con polinizadores y auxiliares.

sipcamiberia.es

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.
Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto y siga las instrucciones.





MATERIAS ACTIVAS	Dodina 40%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada (SC)
Nº REGISTRO	23392

¿QUÉ ES?

Italo® es un fungicida polivalente de amplio espectro a base de Dodina 40%, con acción preventiva, curativa y erradicante.

Gracias a su acción translaminar posee un gran poder curativo y se muestra muy resistente al lavado por la lluvia. Su formulación permite una gran uniformidad y adherencia sobre la vegetación tratada, controlando enfermedades causadas por hongos:

- Olivo contra repilo, aceituna jabonosa.
- Frutales de pepita contra moteado, antracnosis.
- Frutales de hueso contra abolladura, antracnosis, cribado, moteado.

VENTAJAS TÉCNICAS DE ITALO®

- Potente acción fungicida frente a repilo, aceituna jabonosa, gnomonia, antracnosis, abolladura y moteado.
- Acción sinérgica con actividad preventiva, curativa y erradicante.
- Gran capacidad de penetración desplazándose rápidamente de manera translaminar.
- Resistente al lavado (+2h).
- Ideal para la gestión de resistencias.
- Compatible con polinizadores y organismos auxiliares.

USOS AUTORIZADOS

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS	P.S.
CEREZO	Antracnosis y Gnomonia	1,7	14
FRUTALES DE HUESO Melocotón, nectarina y similar	Abolladura	2,25	75
FRUTALES DE PEPITA Manzana y pera	Moteado	1,7	60
NÍSPERO Y NÍSPERO DEL JAPÓN	Moteado	1,7	60
MEMBRILLERO	Moteado	1,7	60
OLIVO	Repilo y aceituna jabonosa	1,7 - 2,25	7

- Aplicar en pulverización normal.

- La primera aplicación puede dosificarse al 0,16-0,20% para acción curativa dentro de las 48 horas desde el comienzo de la infección.

Posicionamiento técnico en olivo

Yema invernal	Brotación primaveral	Brotos florales	Floración	Cuajado	Engorde del fruto	Cambio de color	Maduración	Post-cosecha



REPILO

En **primavera**, desde el desarrollo foliar (**BBCH11**) hasta el final de floración (**BBCH69**) y/o en otoño.

En **aceituna de mesa** en tratamiento de otoño, aplicar **sólo después de la cosecha**.

ACEITUNA JABONOSA

Otoño, aplicar durante el periodo de riesgo de enfermedad (justo antes de las lluvias intensas).

Si las condiciones para antracnosis persisten, se recomienda una **segunda aplicación** a los 19-20 días o cuando los frutos empiecen a cambiar de color.