

MIZUKI®

Mizuki®



MIZUKI®

RÁPIDO, FÁCIL Y EFICAZ

NOVEDAD

- **Innovación:** formulado con los coadyuvantes naturales que aportan la mayor eficacia.
- Rapidez de desecado de las malas hierbas, rebrotes y cultivos de patata.
- Presenta sinergias con herbicidas de otros grupos químicos.
- Control de hierbas difíciles o resistentes a otros modos de acción.
- Idóneo para cubierta vegetal de gramíneas.

¿CÓMO ACTÚA?

Herbicida que actúa solo por contacto, siendo absorbido exclusivamente por las partes verdes de las plantas.

MATERIA ACTIVA: Piraflufen-etil 1,06% (EC)

Formulado novedoso ya que trae en su formulado los coformulantes y coadyuntes naturales óptimos para conseguir la máxima rapidez y las mayores eficacias.

MATERIA ACTIVA Y MODO DE ACCIÓN

PIRAFLUFEN-ETIL (MoA 14 HRAC-WSSA):

Perteneciente al grupo químico de Fenilpirazoles, que actúa exclusivamente por contacto, actúa como inhibidor de la enzima PROTOX (precursor de la síntesis de clorofila), desembocando en una desintegración de la clorofila y los carotenos y en definitiva de toda la célula, produciendo una rápida necrosis de toda la planta.

Nº DE REGISTRO: ES-01431

RECOMENDACIONES DE USO, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Malas hierbas en primeros estadios de desarrollo (2 - 4 hojas) y muy sensibles.

Momento para tratamiento en alcachofa, patata y tomate.

1 l/ha

Malas hierbas en primeros estadios de desarrollo y más sensibles.

Rebotes poco desarrollados, hasta unos 20 cm.

1,5 l/ha

Malas hierbas desarrolladas y especies menos sensibles.

Tratamientos tardíos de rebotes, no lignificados, hasta unos 30 cm. Desecante de patata.

2 l/ha

Presenta sinergias tanto con graminicidas, sistémicos y remanentes.

Volumen de agua aconsejado para efectuar óptimo mojado de las malas hierbas y rebotes: 200 - 400 l/ha.

CULTIVOS Y DOSIS AUTORIZADOS

Cultivo	Uso	Dosis (l/ha)	Nº máx aplic.	Observaciones
Patata	Desecante	2	2	Pre-recolección.
	Herbicida	1	1	Pre-emergencia o Post-emergencia temprana: máx. 5% de plantas visibles.
Tomate	Herbicida	1-2	1	Pre-trasplante: hasta 1 día antes del trasplante.
				Post-trasplante: Tratamiento localizado, evitar aplicar sobre el cultivo.
Alcachofa	Herbicida	0,875	1	Tratamiento localizado, evitar aplicar sobre el cultivo.
Vid y parrales de vid	Herbicida y control de chupones y rebotes	1-2	2	Como herbicida aplicar en Post-emergencia de las malas hierbas. Para control de chupones y rebotes aplicar cuando estos no estén lignificados.
Frutales de pepita				
Frutales de hueso				
Frutales de cáscara				
Kiwi				
Olivo				